

## Desratização

Escrito por Administrator

Sex, 07 de Dezembro de 2012 17:15 - Última atualização Seg, 21 de Janeiro de 2013 10:35

---



Existem três espécies de roedores: a Ratazana, o Rato de telhado e o Camundongo. Eles vivem em colônias organizadas onde existem os machos dominantes, as fêmeas e os ratos dominados, estes só se alimentam após os dominantes já terem se alimentado.

Em geral eles possuem hábitos noturnos só saindo à luz do dia quando sua população aumenta de tal forma que a alimentação se torna escassa.

Os ratos, em geral, são muito desconfiados e, portanto, um alimento novo ou isca encontrada no seu local de passagem é examinada com muita cautela. Desconfiado, o rato deixa que um outro roedor mais novo ou esfomeado devore o alimento primeiro, caso este apresente sinais de doença após a ingestão do alimento, o rato experiente não come a isca e avisa aos demais que aquele alimento é inadequado. As ratazanas são muito mais cautelosas e os camundongos, ao contrário, é muito curioso.

Por esta razão, a eliminação de uma colônia de ratos deve ser feita por empresa especializada, visto ser necessário um monitoramento adequado e utilização de iscas atrativas que não os elimine imediatamente, pois se isto ocorrer elimina-se apenas aqueles mais inexperientes e esfomeados e os sobreviventes se organizam novamente numa colônia mais forte e mais desconfiada.

## Desratização

Escrito por Administrator

Sex, 07 de Dezembro de 2012 17:15 - Última atualização Seg, 21 de Janeiro de 2013 10:35

---